


# OPERATION FOR POLYPPER VERSION 3



**ØREGANGEN** V/Lisa Barfoed Velsø  
Speciallæge i Øre-Næse-Hals  
Omøvej 7 st. tv. 4700 Næstved - tlf. 55 73 20 00  
[www.øregangen.dk](http://www.øregangen.dk)

## Før operationen

Det er vigtigt at barnet føler sig helt tryk. Du kan forberede barnet ved at fortælle, hvad der skal ske. Sut og bamse må meget gerne medbringes.

Barnet skal være fastende for mad, mælk, mælkeprodukter og juice i minimum 6 timer før operationen.

Barnet må gerne få lidt saftevand, men KUN saftevand eller vand, indtil 2 timer før operationen. Børn må ammes indtil 4 timer før operationen.

**HUSK! Forældre skal ikke faste 😊**

Er barnet i behandling med inhalationsmedicin, skal det tages som vanligt om morgenen på operationsdagen.

2 timer før operationen gives følgende smertestillende medicin:

Flydende Panodil 24 mg/ml: Vægt: \_\_\_\_\_ kg. I alt: \_\_\_\_\_ ml x

## Selve operationen

Når i kommer til klinikken, bør større børn (uden ble) tisse inden de bliver kaldt ind, da der ellers er risiko for at de tisser, når de sover.

Når barnet skal opereres, foregår det i fuld narkose ved klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Barnet bedøves ved hjælp af en maske, som lægges over næse og mund indtil barnet er faldet i søvn.

Du vil være ved dit barn indtil det falder i søvn, og igen når det vågner.

Operationen foregår ved, at man skraber polypperne væk med en speciel kniv. Indgrebet varer ca. 15 minutter.

## **Efter operationen**

Der er som regel lidt blod fra næsen kortvarigt efter operationen. Dette stopper som regel ved, at barnet sutter på lidt is. Fortsætter det med at bløde på trods af dette eller bløder det kraftigt fra næsen eller munden skal I kontakte klinikken eller lægevagten med det samme. Lette til moderate smerter de første døgn er helt normalt. Har barnet meget ondt kan I anvende smertestillende, som beskrevet på bagsiden af denne folder. Det må forventes at barnet er hjemme fra institution/skole 1-3 dage. Barnet må gerne pudse sin næse efter operationen.

## **Hjemtransport**

Barnet har godt af frisk luft efter operationen. Hvis I kører i egen bil, så overvej en ledsager udover chaufføren. Vent med at give barnet mad og drikke til I er kommet hjem.

## **Mad**

Barnet må spise alle fødevarer.  
Kolde spise og drikke kan virke smertelindrende.

## **Sport**

Af hensyn til blødningsrisiko frarådes fysisk aktivitet i en uge efter operationen. Herefter ingen begrænsning.

## Smertestillende behandling

PRÆPARAT	MORGEN	MIDDAG	AFTEN	NAT
Panodil mikstur 24 mg/ml				

## HUSK BARNETS SUNDHEDSKORT

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken ved spørgsmål

Tlf.: 55 73 20 00

Mandag, tirsdag\*, onsdag og torsdag kl. 8-11, fredag kl. 8-10.

\*Tirsdag er telefonen lukket på operationsdage – læs hvilke på

[www.øregangen.dk](http://www.øregangen.dk)

OPERATION

dag d. / kl.