


TONSILLOTOMI VERSION 4 (Reduktion af store mandler)



ØREGANGEN V/Lisa Barfoed Velsø
Speciallæge i Øre-Næse-Hals
Omøvej 7 st. tv. 4700 Næstved - tlf. 55 73 20 00
www.oregangen.dk

Før operationen

Det er vigtigt, at barnet føler sig helt trygt. Du kan forberede barnet ved at fortælle, hvad der skal ske. Sut og bamse må meget gerne medbringes.

Barnet skal være fastende for mad, mælk, mælkeprodukter og juice i minimum 6 timer før operationen.

Barnet må gerne få lidt saftevand, men KUN saftevand eller vand, indtil 2 timer før operationen. Børn må ammes indtil 4 timer før operationen.

HUSK!! Forældre skal ikke faste 😊

Er barnet i behandling med inhalationsmedicin, skal det tages som vanligt om morgenen på operationsdagen.

2 timer før operationen gives følgende smertestillende medicin:

Panodil mikstur 24 mg/ml: Vægt: kg. I alt: ml x .

Bonyl mikstur 25 mg/ml: Vægt: kg. I alt: ml x .

Selve operationen

Når I kommer til klinikken, bør større børn (uden ble) tisse inden de bliver kaldt ind, da der ellers er risiko for at de tisser, når de sover.

Når barnet skal opereres foregår det i fuld narkose ved klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Barnet bedøves ved hjælp af en maske, som lægges over næse og mund indtil barnet falder i søvn.

Du vil være ved dit barn, indtil det falder i søvn og igen når det vågner.

Operationen foregår ved, at man skærer den overskydende del af

mandlerne væk med en speciel elektrisk kniv.
Indgrebet varer ca. 30 minutter.

Efter operationen

Som regel er der ikke så store gener ved at få foretaget indgrebet. Moderate smerter de første døgn er helt normalt. Barnet skal have fast smertestillende de første 4-6 dage efter operationen, som beskrevet på bagsiden af denne folder.

I meget sjældne tilfælde kan der opstå blødning efter operationen. I så fald skal I kontakte klinikken. Hvis klinikken er lukket, tag da kontakt til Lægevagten. Ved kraftig blødning, ring 112.

Det må forventes, at barnet er hjemme fra institution/skole resten af ugen.

OBS!! Det er helt normalt, at barnet får hvide belægninger på mandlerne samt dårlig ånde. Problemet kan oftest afhjælpes med mad og drikke.

Hjemtransport

Barnet har godt af frisk luft efter operationen, men hvis I kører i egen bil, skal der være en ledsager med udover chaufføren.
Vent med at spise og drikke til du er kommet hjem.

Mad

I princippet må barnet spise alt, men grove fødevarer og drikkevarer med brus frarådes de første døgn efter operationen.
Kolde spise og drikke kan virke smertelindrende. I forhold til sårheling er det vigtigt at barnet får noget at spise og drikke.

Sport

Af hensyn til blødningsrisiko frarådes fysisk aktivitet i 12-14 dage efter operationen. Herefter ingen begrænsning.

Smertestillende behandling

PRÆPARAT	MORGEN	MIDDAG	AFTEN	NAT
Panodil mikstur 24 mg/ml				
Bonyl mikstur 25 mg/ml				

HUSK BARNETS SUNDHEDSKORT

Du er altid velkommen til at kontakte klinikken ved spørgsmål

Tlf.: 55 73 20 00

Mandag, tirsdag*, onsdag og torsdag kl. 8-11, fredag kl. 8-10.

*Tirsdag er telefonen lukket på operationsdage – læs hvilke på

www.øregangen.dk

OPERATION

dag d. / kl.